






La chirurgie pelvi-périnéale: un travail d'équipe

Katleen Jottard

Afiso 26 mars 2022

Le pelvi-périnée



Le pelvi-périnée



Quelques exemples

Pourquoi travailler en pluri-disciplinarité



Une patiente à la clinique de pelvi-périnéologie

Knowledge and Awareness of Urinary Incontinence Across Europe

1 in 5 suffers from incontinence.



Incontinence is a common condition. You're not the only one.

ogyweek.org

UROLOGY WEEK 2021
20-24 SEPTEMBER

- Femme de 54 ans
- Problème de incontinence urinaire d'urgence
→ urologue
- Incontinence fécale sévère
→ chirurgien digestif

Neuromodulation sacré



Une patiente à la clinique de pelvi-périnéologie

- Plainte principal: Constipation invalidante avec douleur abdominale/pelvienne chronique
 - Chirurgien digestif
- Douleur abdominale/pelvienne chronique avec dysparéunie profonde
 - Avis gynécologie



Endométriose



**DES RÈGLES
QUI FONT MAL.
CE N'EST PAS NORMAL !**



L'ENDOMETRIOSE touche une femme sur dix. Les règles douloureuses peuvent en être un symptôme important. **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN !**

WWW.PROVINCEDELIEGE.BE/ENDOMETRIOSE




**Province
de Liège**
Santé et
qualité de vie

Un patient à la clinique de pelvi-périnéologie




- Douleur périnéale chronique depuis 4 ans
 - Douleur en position assise
 - Sensation de cystite chronique
 - constipation
 - Troubles sexuelles
 - Dépression
- Patient très complexe
- Multi-diagnostiqué (urologue, neurologue, painteam, psychologue,...)
- Multi-traité échec



Névralgie pudendale par syndrome canalaire: 5 Critères indispensables au diagnostic (Critères de Nantes)

- Douleur dans le territoire du nerf pudendal (de l'anus à la verge ou au clitoris)
- Aggravée en position assise (soulagée sur un siège de WC)
- Sans réveil nocturne habituel par la douleur
- Sans déficit sensitif objectif
- Ayant un bloc diagnostique du nerf pudendal positif



Labat JJ, Riant T, Robert R, Amarenco G, Lefaucheur JP, Rigaud J. Diagnostic criteria for pudendal neuralgia by pudendal nerve entrapment (Nantes criteria). NeuroUrol Urodyn. 2008;27:306-10.



pudendopathie


Patiente à la clinique

- Constipation
 - Douleur anale
 - Dysurie
 - Dysparéunie superficielle
- Chirurgie digestif : hémorroïdectomie
- Gynaecologue: cure de prolapsus
- échec



Anisme: dyskinésie puscle puborectale






age	sexe	date intervention	type intervention	principal complaint
72	F	5/12/2017	RECTOPEXIE ROBOT	prolaps urogenital/ SHV

- Avis urologie


- Examen urodynamique
- Débitmétrie
 - Vessie atone
 - Pas de geste associé
 - Rectopexie



Traitement chirurgical de prolapsus urogénital

- Conservateur pessaire
- Kiné
- Cure chirurgicale par voie périnéale
- Par voie laparoscopique
 - Rectopexie
 - Rectocystopexie
 - Avec / sans hystérectomie

Figuur 1 Soort vaginale verzakking




A cystocele;

B rectocele;

C enterocele

Bron: De Vries H, De Jongh TOH, Grundmeijer HGLM, redactie Diagnostiek van alledaagse klachten II. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003.



Troubles pelvi- perineale

- Pathofysiologie complexe
 - Clinique hétérogène
- Un défi diagnostique et thérapeutique
- NICE: national institute for health and care excellence:
- Multidisciplinary teams
- INAMI: centre d'implantation de neuromodulation sacré
- Multidisciplinary teams

Pathologies

- Incontinence urinaire
- Incontinence anale
- Douleur périnéale
- Douleur pelvienne
- Constipation
- Troubles sexuelles

Equipe

Gynecologue

Urologue

Chirurgien digestif

Gastro-entérologue

Anesthésiste – spécialiste de la douleur

Radiologue

Kinésistes

Sexuologue

Psychologue

Diéticienne

infirmière



C H U | U V C
B R U G M A N N
P E R I N E O L O G I E



C H U I U V C
B R U G M A N N
P E R I N E O L O G I E

Thank you